














	<p><i>Agrocybe firma</i> (Peck) Singer</p>	
<p>Agrocybe velouté</p>		<p>Fiche: 1666 Table: 5D3</p>
<p>Habitat : sur bois de feuillus</p> <p>  Odeur : farine Synonymes : </p>		 <p><i>Cliché : Pierre Roux</i></p>
<p>Chapeau mat finement velouté, aux couleurs chaudes</p>		<p>Rare</p> <p>N° TAXREF : 36707</p>

	<p><i>Amanita phalloides</i> (Fries : Fries) Link</p>	
<p>Amanite phalloïde</p>		<p>Fiche: 3352 Table: 6B10</p>
<p>Habitat : surtout sous chênes et sous châtaigniers.</p> <p>  Odeur : rose fanée Synonymes : <i>Amanitaria phalloides, Amanita viridis, Lepidella phalloides</i> </p>		 <p><i>Cliché : Guillaume Eyssartier</i></p>
<p>Chapeau jaune verdâtre à olivâtre, parfois brun olivâtre, vergeté de fibrilles plus foncées, pied chiné de zigzag verdâtres, odeur faible puis de rose fanée. Mortel.</p>		<p>Commun</p> <p>N° TAXREF : 39106</p>

	<p><i>Boletus aestivalis</i> (Paulet) Fries</p>	
<p>Cèpe d'été</p>		<p>Fiche: 72 Table: 1A4</p>
<p>Habitat : surtout sous feuillus</p> <p>  Odeur : faible Synonymes : <i>Boletus reticulatus, Boletus rubiginosus</i> </p>		 <p><i>Cliché : Laurent Francini</i></p>
<p>Chapeau brun clair à brun, pied entièrement couvert d'un réseau blanc puis brun, pores blancs puis jaune verdâtre, chair blanche même sous le revêtement du chapeau. Couramment consommé.</p>		<p>Commun</p> <p>N° TAXREF : 29362</p>

	<p><i>Clavaria zollingeri</i> Leveillé</p>	
<p>Clavaire violette</p>		<p>Fiche: 5081 Table: 15A1</p>
<p>Habitat : au sol</p> <p>  Odeur : agréable Synonymes : <i>Clavaria lilacina</i> </p>		 <p><i>Cliché : Laurent Francini</i></p>
<p>Dans les prés maigres parsemés de fougères et d'arbres tels que <i>Betula</i> spp. (bouleaux) et <i>Quercus</i> spp. (chênes)</p>		<p>N° TAXREF : 40872</p>